

# PEDIDERM®

deltametrina - DCB: 02748

## FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

**PEDIDERM®** loção - Embalagem contendo um frasco de 100 mL.

**PEDIDERM®** shampoo - Embalagem contendo um frasco de 100 mL.

## USO TÓPICO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

Cada 1 mL de **PEDIDERM®** loção contém:

deltametrina .....	0,2 mg
Excipientes q.s.p. ....	1 mL

(propilenoglicol, álcool etílico, água purificada e essência floral).

Cada 1 mL de **PEDIDERM®** shampoo contém:

deltametrina .....	0,2 mg
Excipientes q.s.p. ....	1 mL

(ácido cítrico, cloreto de sódio, dietanolamina cocamida, laurilletsulfato de sódio, álcool etílico, essência floral e água purificada).

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

**Ação do medicamento:** a deltametrina atua como pediculicida e escabicida. Os sinais de melhora nos sintomas podem ocorrer em um prazo variável de dias, após o início do tratamento. Seu médico é a pessoa adequada para dar-lhe mais informações sobre o tratamento; siga sempre as orientações. Não devem ser utilizadas doses superiores às recomendadas.

**Indicações do medicamento:** **PEDIDERM®** está indicado no tratamento e profilaxia da pediculose (piolhos), da ftiíriase (chatos), da escabiose (sarna) e das infestações por carrapatos em geral.

**Riscos do medicamento:** **PEDIDERM®** é contraindicado para pacientes que apresentem antecedentes de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

**Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.**

**Informe ao seu médico sobre a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao seu médico se está amamentando.**

Desconhecem-se efeitos adversos pelo uso do produto na gravidez ou lactação. Contudo, deve-se considerar o risco-benefício antes da indicação.

**Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.**

**Não há contra-indicação relativa a faixas etárias.**

A administração conjunta do produto com outros medicamentos só deverá ser realizada após consulta do médico assistente. O uso em crianças e gestantes deve obedecer a cuidados e observações rigorosos. No caso de contato com os olhos, lavá-los por cerca de 15 minutos em água corrente e procurar orientação médica. O produto deverá ser aplicado em local ventilado. Evitar a contaminação de alimentos pelo produto. Não reutilizar o recipiente vazio. Como normas gerais de higiene, são recomendadas: ferver as roupas de cama e uso pessoal, mantendo-as limpas; manter as unhas curtas e limpas; no caso de pediculose (piolhos) e ftiíriase (chatos) manter os cabelos curtos e limpos; evitar exageros de coçar, e colocar luvas de proteção nas crianças; procurar descobrir possíveis portadores e possíveis contatos com eles e seus objetos de uso; e, alertar os responsáveis por instituições coletivas frequentadas pelo portador do parasita, principalmente escolas e creches.

**NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.**

**Modo de uso:** **PEDIDERM®** loção deverá ser usado somente no corpo. Para os cabelos e couro cabeludo usar **PEDIDERM®** shampoo. Não usar o produto para sobrancelhas ou cílios. Ver item "Posologia".

**Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

**Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.** A interrupção repentina deste medicamento não causa efeitos desagradáveis, nem riscos, apenas cessará o efeito terapêutico.

**Reações adversas:** em alguns casos, o produto pode produzir algumas reações desagradáveis, transitórias na maioria das vezes.

**Conduta em caso de superdose:** Procure imediatamente um médico ou um hospital mais próximo.

**Cuidados de conservação e uso:** **PEDIDERM®** deve ser conservado em sua embalagem original, evitar local quente (ambiente com temperatura entre 30°C e 40°C). **PEDIDERM®** possui prazo de validade de 36 meses a partir da data de fabricação, desde que observados os cuidados de conservação. **Não use o medicamento com o**

**prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento**  
**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A deltametrina é a substância mais ativa da classe dos piretróides, substância sintética obtida por esterificação do ácido crisantêmico. A deltametrina apresenta elevado coeficiente de segurança e baixa toxicidade para mamíferos. Possui considerável efeito residual e alto poder letal contra piolhos e ácaros. A deltametrina apresenta notáveis propriedades pediculicidas e escabicidas, sendo o *Pediculus humanus capitis*, *Pediculus humanus humanus*, *Phthirus pubis* e seus ovos extraordinariamente sensíveis à sua ação. A sua ação é seletiva e se dá após a absorção da substância através do exoesqueleto de quitina dos ectoparasitas. Uma vez no interior do organismo do inseto, a deltametrina transportada pela hemolinfa, fixa nos gânglios nervosos periféricos e nas estruturas motoras do Sistema Nervoso Central, produzindo excitabilidade, incoordenação motora, paralisia, letargia e morte do parasita.

## INDICAÇÕES

**PEDIDERM®** está indicado no tratamento e profilaxia da pediculose (piolhos), da ftiíriase (chatos), da escabiose (sarna) e das infestações por carrapatos em geral.

## CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade à deltametrina ou a qualquer outro componente da formulação, alergia respiratória, lesões de pele, como feridas e queimaduras, ou condições que possibilitem maior absorção.

## PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

**PEDIDERM®** está indicado somente para uso tópico. Não deve ser ingerido ou inalado. Deve ser mantido fora do alcance dos olhos e mucosas. No caso de contato acidental com os olhos, lavá-los imediatamente com água corrente por alguns minutos. No caso de infecção ou irritação da pele, interromper o tratamento. Desconhecem-se efeitos adversos pelo uso de **PEDIDERM®** na gravidez e lactação. Contudo deve-se considerar o risco-benefício antes da indicação.

## INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Ainda não foram totalmente relacionadas as interações do produto com outras drogas e/ou medicamentos.

## REAÇÕES ADVERSAS

Podem ocorrer irritação cutânea, ocular e reações de hipersensibilidade, sobretudo do tipo alergia respiratória. No caso do uso em pele lesada por feridas ou queimaduras, pode ocorrer maior absorção da deltametrina com efeitos gastrintestinais e neurológicos agudos.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR

**Loção:** Friccionar toda região afetada do corpo, caso necessário, deixando permanecer até o próximo banho. Usar durante 4 dias consecutivos.

**Shampoo:** Deve ser aplicado nos cabelos e couro cabeludo, de preferência durante o banho, fazendo ligeiras fricções com a ponta dos dedos. Deixar nas áreas atingidas durante 5 minutos. Enxaguar bem. Usar durante 4 dias consecutivos. Sob todas as formas, o produto deve ser usado novamente 7 dias após o primeiro uso, repetindo o esquema de tratamento, devido à possível reinfestação por permanência de ovos.

## SUPERDOSE

No caso de ingestão acidental, o tratamento é principalmente de suporte. Deve-se induzir vômito nos indivíduos conscientes ou realizar lavagem gástrica nos inconscientes. Pode-se administrar sais catárticos para aumentar o trânsito intestinal e diminuir a absorção intestinal da piretrina. No caso de inalação acidental, pode-se necessitar de respiração artificial.

## PACIENTES IDOSOS

Não foram relatados restrições quanto ao uso do produto em pacientes maiores de 65 anos de idade.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

**NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: VIDE CARTUCHO.**

**CIFARMA - Científica Farmacêutica Ltda.**

Rod. BR 153 Km 5,5 - Jardim Guanabara - CEP: 74675-090 - Goiânia / GO

CNPJ: 17.562.075/0001-69 - Indústria Brasileira

Farm. Resp.: Dra. Michele Caldeira Landim - CRF/GO: 5122

Reg. MS: 1.1560.0015