



WP LAB
Indústria Farmacêutica
— DESDE 1933 —

Novamidala®

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: **NOVAMIDALA®**

Insumos ativos: Aconitum napellus, Baryta carbonica, Phytolacca decandra

Medicamento Homeopático

APRESENTAÇÕES

Apresentação comercial:

Frasco de vidro âmbar contendo 20 mL, com gotejador atóxico.

Forma farmacêutica: Solução oral

Via de administração: **ORAL**

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

COMPOSIÇÃO

Cada mL contém:

Aconitum napellus.....6CH.....álc. 30%(v/v).....0,33 mL

Baryta carbonica.....5CH.....álc. 30%(v/v).....0,34 mL

Phytolacca decandra.....5CH.....álc. 30%(v/v).....0,33 mL

Veículo: álcool de cereais

Gradação alcoólica final: 30%

33 gotas equivalem a, aproximadamente, 1 mL do medicamento

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

NOVAMIDALA® é indicado como auxiliar no tratamento dos sintomas da amigdalite, da faringite, da laringite, da deglutição difícil e dolorosa, da dor e irritação da garganta, da garganta seca, vermelha e dolorida, da rouquidão e da afonia (perda de voz).

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

NOVAMIDALA® tem como mecanismo de ação, o estímulo das células por meio de doses mínimas e potencializadas, que despertam as forças curativas do organismo na direção do combate aos sintomas da amigdalite, da faringite, da laringite, da deglutição difícil e dolorosa, da dor e irritação da garganta, da garganta seca, vermelha e dolorida, da rouquidão e da afonia (perda de voz).

Ação individual dos insumos farmacêuticos ativos (IFAs) da formulação do NOVAMIDALA®:

Aconitum napellus: Age no combate as amígdalas inchadas, laringite, garganta seca, vermelha e dolorida, deglutição difícil e dolorosa.

Baryta carbonica: Age no combate da rouquidão, amigdalite, faringe seca, deglutição difícil e dolorosa, dor de garganta e afonia.

Phytolacca decandra: Age no combate a amigdalite, faringite, deglutição difícil e dolorosa, irritação na garganta e afonia.

As indicações terapêuticas atribuídas a este medicamento são comprovadas pelas matérias médicas e repertórios homeopáticos, após experimentação individual de seus insumos ativos em indivíduos saudáveis.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é **contraindicado para menores de 2 (dois) anos.**

Este medicamento não deve ser utilizado por **mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista (categoria “C”).**

O que significa risco de gravidez “categoria C”? Significa que para este medicamento não foram realizados estudos em mulheres grávidas.

Este medicamento é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Até o momento, são desconhecidas outras contraindicações do medicamento NOVAMIDALA®.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Evite gotejar sob a língua, por produzir ardência causada pela presença de álcool.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao seu médico se está amamentando.

Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

Este medicamento contém ÁLCOOL no teor de 30%.

NOVAMIDALA® possui, em sua formulação, insumos ativos homeopáticos que podem apresentar incompatibilidade específica com outros insumos ativos homeopáticos, conforme descrito abaixo:

Incompatibilidade Baryta carbonica: Calcarea carbonica.

Inimigo Baryta carbonica: Apis mellifica e Calcarea carbonica.

Até o momento são desconhecidas reações adversas, interações medicamentosas, interações associadas a alimentos e bebidas alcoólicas e alterações em exames laboratoriais com o uso do medicamento NOVAMIDALA®.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em local seco e a temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), dentro da embalagem original, durante todo o prazo de validade do medicamento. Proteger da luz e da umidade. Evitar radiações.

Número de lote, datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento: líquido, incolor e com odor alcoólico. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Administração Via Oral.

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias é proibido.

Posologia sugerida:

CRIANÇAS ACIMA DE 2 ANOS

Nos casos agudos: Tomar 5 gotas em 5 mL de água (medida de uma colher de chá) de hora em hora, espaçando o horário para intervalos de duas em duas horas, de três em três horas e assim sucessivamente, à medida que houver regressão dos sintomas, ou conforme orientação médica.

Como preventivo: Tomar 5 gotas em 5 mL de água (medida de uma colher das de chá) uma vez ao dia pelo período de 6 meses, ou conforme orientação médica.

ADULTOS

Nos casos agudos: Tomar 10 gotas em 5 mL de água (medida de uma colher das de chá) de hora em hora, espaçando o horário para intervalos de duas em duas horas, de três em três horas e assim sucessivamente, à medida que houver regressão dos sintomas, ou conforme orientação médica.

Como preventivo: Tomar 10 gotas em 5 mL de água (medida de uma colher das de chá) uma vez ao dia pelo período de 6 meses, ou conforme orientação médica.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 3 (três) dias, consulte um profissional de saúde.

No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

Continue seguindo corretamente o modo de usar descrito nesta bula.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Até o momento, são desconhecidas reações adversas do medicamento NOVAMIDALA®.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também ao fabricante através do canal oficial de atendimento ao consumidor: sac@wplab.ind.br.

Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

Não foram evidenciadas intoxicações agudas de nenhuma grandeza advindas de superdosagem deste medicamento.

Em caso de ingestão acidental e/ou acima da dose sugerida/prescrita pelo clínico, ou em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure o clínico ou o farmacêutico.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação, ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme RDC n.º 238/2018.

Farmacêutica Responsável: Dr.ª Giselle da Costa Mateus
CRF - PR 16959

Homeopatia Waldemiro Pereira - Laboratório Industrial Farmacêutico Eireli.

CNPJ: 76.440.528/0001-43

Rua Anne Frank, 3246-B - Curitiba - PR - CEP 81650-020

Indústria Brasileira

® Marca Registrada

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

SAC: (41) 3013-6464 | sac@wplab.ind.br

De Segunda à Sexta-feira, das 08:00h às 18:00h.

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.



WP LAB
Indústria Farmacêutica

— DESDE 1933 —

V00-BP